



Faire un pansement compressif

- 1 Appliquez du coton ou, à défaut, une couche de mouchoirs en papier directement sur la plaie.
- 2 Fixez-les à l'aide d'une bande de gaze.
- 3 Posez encore une couche de mouchoirs (ou autre) et fixez à nouveau avec la bande de gaze.
- 4 Pour finir, faites un nœud.



Bander la patte


- 1 Posez de longues bandes de coton entre les doigts et sous la griffe de loup. Les bandes doivent être suffisamment longues et dépasser d'une bonne longueur afin de ne pas glisser après la pose du pansement.
- 2 Appliquez une bande de coton d'environ la largeur d'une patte, du haut de la patte jusqu'au bas de la patte.
- 3 Commencez maintenant à fixer le coton à l'aide d'une bande de gaze élastique. Posez la bande de gaze une seule fois, du haut vers le bas de la patte.
- 4+5 Enroulez la bande de gaze plusieurs fois autour de la patte de manière que celle-ci soit entièrement recouverte. Serrez la bande pour que le bandage soit bien ajusté. Attention : la patte ne doit pas être comprimée ni la circulation sanguine entravée.
- 6 Enveloppez le pansement terminé à certains endroits avec du ruban adhésif résistant à l'eau.



Fixer le museau

En raison d'un choc, de la peur ou de la douleur, un chien blessé peut mordre. Pour éviter ce risque, vous pouvez lui bander le museau.

- 1 Nouez délicatement une boucle autour du museau ; le nœud doit être orienté vers le haut.
- 2 Refaites une boucle autour du museau et faites cette fois le nœud sous la gueule du chien.
- 3 Puis, faites passer les deux brins de la bande des deux côtés de la tête du chien, sous les oreilles, pour les nouer finalement sur la nuque.



Reconnaître une intoxication

Les symptômes sont : forte salivation, vomissements, diarrhée, problèmes circulatoires, signes de défaillance neurologique tels qu'une apathie ou une démarche chancelante.

Si vous avez le moindre doute, amenez immédiatement l'animal chez un vétérinaire. S'il y en a, emportez les restes de ce que le chien a mangé chez le vétérinaire pour qu'il puisse prendre les mesures appropriées.

Coup de chaleur

Les symptômes sont : halètement ou salivation intense, battements cardiaques rapides (perceptibles sur le côté gauche de la poitrine) et pouls élevé (perceptible au milieu de l'intérieur de la cuisse, normalement entre 80 et 120 battements par minute), abattement, mouvements non coordonnés et, le cas échéant, crampes ou même perte de connaissance

- + Mettez immédiatement le chien à l'ombre ou dans un endroit plus frais
- + Le rafraîchir avec de l'eau ou des linges mouillés pour faire baisser la température corporelle. Pour éviter un choc, ne jamais verser de l'eau sur l'animal entier, mais procéder lentement, des pattes vers le cœur.

Troubles ou arrêts respiratoires

- + Placez le chien en position latérale de sécurité (position PLS). Pour ce faire, couchez le chien sur le côté droit et tirez légèrement sa tête vers l'arrière.
- + Ouvrez sa gueule et sortez doucement sa langue pour vérifier si des vomissures obstruent les voies respiratoires. Si c'est le cas, retirez-les immédiatement.
- + Repoussez ensuite sa langue dans la cavité buccale et fermez le museau.
- + Placez un linge sur sa truffe, maintenez le museau fermé en formant si nécessaire un anneau avec les doigts de l'autre main et soufflez 5 à 6 fois dans les narines à travers le linge.
- + Attendez environ 1 minute pour voir si la respiration spontanée reprend. Dans ce cas, la cage thoracique se soulève. Si ce n'est pas le cas, reprenez la ventilation, cette fois-ci à raison d'environ 20 insufflations par minute.
- + Arrêtez la ventilation si le chien ne respire pas à nouveau de manière autonome au bout de 10 minutes.



Arrêt cardiaque

- + Couchez le chien sur le côté droit et vérifiez d'abord l'absence de corps étranger dans la cavité buccale.
- + Posez votre main à plat sur sa cage thoracique, derrière le coude gauche, et compressez-la légèrement 10 fois de suite (exercez moins de pression sur les petites races et plus sur les grandes).
- + Puis ventilez 2 fois de suite comme décrit précédemment et attendez de voir si les battements de cœur et la respiration reprennent. Si ce n'est pas le cas, continuez la procédure au rythme de 15 massages cardiaques pour 2 insufflations d'air dans les narines. Pour les chiens de moins de 20 kg, le massage cardiaque peut également être effectué avec les mains jointes sur le chien couché sur le dos.


Instructions de pliage

5	6	7	8	7	8	8	8
4	3	2	1	2	1	1	1

Transporter un animal blessé

- 1 Saisissez le chien au ventre, au niveau des pattes arrière, et à l'avant, au niveau de la poitrine. Le côté blessé de l'animal doit se trouver à l'opposé de votre corps.
- 2 Si le chien s'est blessé ou s'est cassé les pattes, celles-ci doivent pendre librement.

Si l'animal est inconscient, il faut d'abord le repositionner sur le côté, puis le transporter en position latérale. Veillez à ce que le chien soit couché sur le côté non blessé. Couchez doucement le chien sur le côté, alignez sa tête dans l'axe de sa colonne vertébrale, éloignez doucement les pattes avant des pattes arrière. Si le chien est inconscient, étirez la tête, ouvrez la gueule et sortez la langue pour que le chien puisse respirer librement.



Les premiers secours pour les chiens



Vérifier que le chien est encore conscient

- + Appelez le chien par son nom et observez ses réactions au niveau des oreilles, des yeux et de la queue.
- + Testez également la réaction pupillaire (la pupille se rétrécit en cas d'exposition soudaine à la lumière) et le réflexe palpébral (un léger contact avec la paupière entraîne une fermeture immédiate de celle-ci).
- + Vérifiez la fréquence cardiaque/le pouls : vous pouvez sentir les battements du cœur sur la paroi latérale gauche de la poitrine et le pouls au milieu de l'intérieur de la cuisse ; la valeur normale se situe entre 80 et 120 battements par minute.
- + Contrôlez la respiration : soulèvement et abaissement de la cage thoracique ; 10 à 40 respirations par minute sont normales.
- + Examinez les muqueuses : normalement elles sont roses, humides et brillantes.
- + Vérifiez le temps de remplissage capillaire : après une pression du doigt sur la gencive, celle-ci doit repasser du blanc au rose en moins de 2 secondes ; ce qui n'est pas le cas en état de choc.

