



Drukverband aanleggen

- 1 Plaats watten of als alternatief een laag zakdoekjes op de wond.
- 2 Omwikkel deze daarna met een gaasverband.
- 3 Daarna nog een laag tissues (of iets dergelijks) en zet dit ook weer vast met het gaasverband.
- 4 Maak ten slotte een knoop.



Pootverband aanleggen


- 1 Plaats lange stroken watten tussen de tenen en onder de klauw. De stroken moeten lang genoeg zijn en een flink stuk uitsteken, zodat ze niet verschuiven nadat het verband is aangebracht.
- 2 Leg een strook watten ongeveer zo breed als de poot van de bovenkant van de poot tot de onderkant.
- 3 Begin nu de watten vast te zetten met het elastische gaasverband. Wikkel het gaasverband eenmaal van boven naar beneden over de poot.
- 4+5 Wikkel het gaasverband een paar keer om de poot, zodat deze helemaal bedekt is. Trek het verband aan zodat het goed aansluit. De poot mag echter niet worden ingesnoerd, de bloedcirculatie mag niet worden belemmerd.
- 6 Omwikkel het afgewerkte verband.



Snuitverband aanleggen

Door shock, angst of pijn kan een gewonde hond bijten. Om dit gevaar te voorkomen, kunt u een snuitverband aanleggen.

- 1 Knoop voorzichtig een lus om de bek – de knoop moet daarbij naar boven wijzen.
- 2 Sla de lus nog een keer om de bek heen en leg er aan de onderkant ook een knoop in.
- 3 Leid vervolgens de lus (onder de oren) naar de nek en knoop de lus daar een laatste keer.



Vergiftiging herkennen

Symptomen: Hevig kwijlen, braken, diarree, problemen met de bloedsomloop, neurologische problemen zoals apathie of wankelend lopen.

Als u vergiftiging vermoedt, zoek dan onmiddellijk de hulp van een dierenarts. Neem de resten van het gegeten materiaal (indien beschikbaar) mee naar de dierenarts, zodat deze kan bepalen wat de juiste maatregelen zijn.

Hitteberoerte

Symptomen: Zwaar hijgen of kwijlen, snellere hartslag (te voelen aan de linkerzijde van de borstwand) en hoge pols (in het midden van de binnenkant van de dij te voelen, normaal 80 – 120 slagen per minuut), vermoeidheid, ongecoördineerde bewegingen en mogelijk krampen of zelfs bewusteloosheid

- + Breng de hond onmiddellijk in de schaduw of een koelere omgeving
- + Koel de hond af met water of natte doeken om de lichaamstemperatuur te verlagen. Om een schok te voorkomen, mag u nooit het hele dier met water overgieten. Giet langzaam water vanaf de poten in de richting van het hart.

Ademhalingsstoornissen of ademstilstand

- + Leg de hond op de rechterzij en strek zijn kop lichtjes.
- + Open zijn bek en trek voorzichtig zijn tong eruit om te controleren of er braaksel de luchtwegen blokkeert. Zo ja, verwijder dit dan onmiddellijk.
- + Duw daarna de tong terug in de bek en houd de snuit gesloten.
- + Leg een doek over de neus, houd de snuit dicht, vorm zo nodig een ring met de vingers van de andere hand en blaas daardoor 5 tot 6 keer in de neus.
- + Wacht ongeveer 1 minuut om te zien of de ademhaling weer spontaan hervat wordt. In dat geval moet de borstkas omhoog gaan. Zo niet, ga dan door met beademen, deze keer met ongeveer 20 ademhalingen per minuut.
- + Stop de beademing als de hond na 10 minuten nog steeds niet zelfstandig ademt.



Hartstilstand


- + Leg de hond op de rechterzij en controleer eerst de bek op vreemde voorwerpen.
- + Leg uw hand plat op zijn borst achter de linkerelleboog en knijp er 10 keer zachtjes in (minder druk uitoefenen bij kleine rassen en meer bij grotere rassen).
- + Beadem daarna 2 keer en kijk of de hartslag en ademhaling hervat worden. Zet anders de procedure voort met een verhouding van 15x hartmassage en 2x beademing. Voor honden tot 20 kg kan hartmassage met gevouwen handen ook in rugligging worden gedaan.

Vouwinstructies

5	6	7	8	7	8	8	8
4	3	2	1	2	1	1	1

Vervoer van gewonde dieren

- 1 Pak de buik van de hond vast bij de achterpoten en aan de voorkant. De gewonde kant van het dier moet van uw lichaam af gericht zijn. Als de hond zijn poten heeft verwond of mogelijk gebroken, moeten de poten vrij hangen.
 - 2 In het geval van bewusteloze dieren moet u ze eerst op hun zij leggen en dan in zijligging vervoeren.
- Zorg ervoor dat de hond op de kant zonder verwonding ligt. Leg de hond voorzichtig op zijn zij, breng de kop en de ruggengraat in een rechte lijn, trek de voor- en achterpoten voorzichtig uit elkaar. Als de hond bewusteloos is, strek dan de kop, open de bek en trek de tong uit de bek zodat de hond goed kan ademen.



Eerste hulp voor honden



Bewustzijn controleren

- + Roep de hond bij zijn naam en let op zijn reacties met de oren, ogen en staart.
- + Test de pupilreactie en de ooglidreflex: plotselinge blootstelling aan licht doet de pupil vernauwen en lichte aanraking van het ooglid doet het ooglid onmiddellijk sluiten.
- + Controleer het hartritme: de hartslag is te voelen aan de linkerzijde van de borstwand, de pols in het midden van de binnenkant van de dij. De normale waarde is 80 tot 120 slagen per minuut.
- + Controleer de ademhaling: het omhoog en omlaag gaan van de borstkas; normaal is 10 tot 40 ademhalingen per minuut.
- + Controleer de slijmvliezen: normaal gesproken een roze kleur, vochtig en glanzend.
- + Controleer de capillaire refill-tijd: na met de vinger op het tandvlees drukken, moet dit binnen 2 seconden van wit weer roze worden – in het geval van shock gebeurt dit niet.

